

ANTIBIOTIKA-ANBEFALINGER



Gjør kloke valg

Norsk barnelegeforening

- Unngå rutinemessig antibiotikabehandling ved akutt ørebetennelse hos barn over 1 år
- Unngå å fortsette antibiotikabehandling hos nyfødte etter 36-48 timer dersom ingen vekst i blodkultur og fredelig klinikk

Norsk forening for allmenntmedisin

- Unngå å ta CRP og hurtigtest for streptokokker før indikasjonen har blitt vurdert av lege | Gjør kloke valg

Norsk forening for infeksjonsmedisin

- Unngå rutinemessig å utføre CT før lumbalpunksjon ved mistanke om akutt bakteriell meningitt
- Unngå bruk av antibiotika hos pasienter i livets slutfase uten å først ha diskutert effekt og bivirkninger
- Unngå å fortsette antibiotikabehandling uten å vurdere deeskalering ut fra klinisk utvikling og mikrobiologiske prøvesvar
- Unngå å fortsette antibiotikabehandling uten å gjøre en daglig vurdering av behov
- Unngå å avstå fra penicillinpreparater uten å vurdere om det foreligger en reell penicillinallergi hos en pasient med angitt allergi i journal

Norsk forening for klinisk farmakologi

- Unngå forskrivning av makrolider og ciprofloksacin, unntatt på spesifikk indikasjon
- Unngå bruk av antibiotika ved akutt bronkitt

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

- Unngå rutinemessig bruk av antibiotika ved bihulekirurgi
- Unngå bruk av oral antibiotika ved ukomplisert akutt ekstern otitt
- Unngå rutinemessig forskrivning av systemiske antibiotika ved ukomplisert renning fra ører med ventilasjonsrør eller ved akutt mediaotitt
- Unngå CT bihuler og ukritisk forskrivning av antibiotika ved ukomplisert akutt rhinosinusitt

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

- Unngå urindyrkning ved fravær av symptomer hos voksne

Norsk forening for geriatri

- Unngå bruk av antibiotika ved asymptomatisk bakteriuri hos eldre

Den norske tannlegeforening

- Antibiotika skal ikke brukes rutinemessig ved behandling av marginal periodontitt og periimplantitt
- Antibiotika skal ikke forskrives ved smerter

Norges Farmaceutiske Forening

- Unngå å anbefale snarlig legebesøk, ved god allmenntilstand, for å få antibiotika for «vent og se»-symptomer
- Anbefal å avvente uthenting av antibiotika på vent-og-se-resepter samme dag som de er forskrevet