

# Anafylaksi.

- Årsaker: inntak av næringsmidler, medikamenter, insektstikk, injeksjon av legemidler, røntgen kontrastmidler, vaksiner.
- Massiv frigjøring av mediatorer.
- Kan gi sirkulasjonssvikt pga. vasodilatasjon og væske lekkasje til interstitiet.

# Anafylaksi.

- Organer som kan bli rammet:
- **Hjerte/karsystemet** med hypotensjon og kollaps (I verste fall hjertestans).
- **Respiratoriske** med larynxødem og stridor og astmaanfall.
- **Hud** med urticaria, kløe i hender og fotsåler.
- **Mage** med kolikksmerter(diare/oppkast)

# Anafylaksi.

- Kasuistikk.
- Far ringer søndag kl.12 om datteren på 20 år med magesmerter-----

# Anafylaksi.

- Behandling:
- **ADRENALINE- ADRENALINE-ADRENALINE** med 0,5 ml-1 ml av **1mg/ml** i skulderen. Barn 0,1 mg/10 kg. Dosen kan gjentas. Ved kritisk situasjon kan katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml med dose 0,5-1 ml gis i.v. over 1 minutt.
- Ved astma besvær Ventolin på pariapparat, hvis lite effekt aminofyllin i.v. LANGSOMT.
- Antihistamin i.m
- Solucortef 100 mg i.v.
- Ved hypotensjon væske i.v.
- Innleggelse sykehus.