

LUFTVEISHÅNDBTERING

- VURDERE PASIENTENS VENTILASJON
- GI OKSYGEN
- ASSISTERE VENTILASJONEN
- OVERTA VENTILASJONEN

VURDERING

- SE:
 - FREMMEDLEGEMER I MUNNEN
 - HEVELSER
 - RESPIRASJONSFREKVENNS
 - RESPIRASJONSMØNSTER
 - INNDRAGNINGER

VURDERING

- LYTT
 - FREMMEDLYDER
 - SURKLING
 - PIPING
 - DYBDE
 - FREKVENS





VURDERING

- KJENN
 - SKADER I THORAX

"VERKTØY"

- KJEVELØFT/HAKELØFT
- SVELGTUBE
- MASKE/BAG
- KANTARELL
- LARYNXTUBE
- I-GEL
- OKSYGEN


SVELGTUBE




LARYNX TUBE



LARYNX TUBE



I-GEL



I-GEL



OKSYGEN

- NESEKATETER 0,5-4 L/MIN 24-34%
- OKSYGENMASKE 5-8 L/MIN 35-60%
- RESERVOARMASKE 10-15 L/MIN 60-90%

TAKE HOME

- LUFTVEISHÅNDBTERING ER VIKTIG!
- BRUK ENKLE TEKNIKKER SOM DU BEHERSKER!
- TREN OFTE!
- TILKALL HJELP RASKT!
- HA SUPRAGLOTTISK AIRWAY DEVICE (SAD) TILGJENGELIG!
- INTUBASJON KUN HVIS DAGLIG ERFARING OG MED MEDIKAMENTER!